

IME I PREZIME: MARIO ČIPIĆ

BROJ INDEKSA:

MATEMATIKA 3: KOLOKVIJ 1: Trajanje 120 minuta. Zabranjen je razgovor sa drugim studentima. Na klupama je dozvoljen samo pisani pribor, kalkulator, indeks ili ksilica i prazni papiri koji nose ime studenta. Sav ostali pribor, formule, uređaji, bilješke i nepotpisane prazne papire zabranjeno je koristiti i trebaju ostati u torbi ili pohranjeni kod nastavnika (elektronički uređaji trebaju biti isključeni) tokom cijelog trajanja ispita. Studenti koji primijete zabranjene predmete dužni su ih prijaviti nastavniku. Nije dozvoljeno međusobno posuđivanje pribora tijekom trajanja ispita. Povreda ovih pravila može za posledicu imati udaljavanje s ispita. ZADATKE RIJEŠAVATE JEDNOSTRANO NA PREDLOŠKU KOJI MOŽETE DOBITI OD NASTAVNIKA.

Broj ↓  
bodova

Dana su vam 4 zadatka u prvom kolokviju, a biti će zadana još 4 u drugom kolokviju. Svaki zadatak nosi 25 bodova. Slika i točno postavljanje integrala u odgovarajućim koordinatama nosi 20 bodova, a uspješno integriranje još 5. Ukupno trebate sakupiti najmanje 100 bodova u dva kolokvija, od čega u prvom kolokviju potpuno točno treba biti riješen najmanje jedan zadatak, a isto tako i u drugom kolokviju.

1. Krug radijusa  $r = 2$  sa središtem u točki  $T(2, 2)$  označen je sa  $K(T, 2)$ . Izračunati  $\iint_{K(T, 2)} x \, dx \, dy$
2. Odrediti volumen područja koji je omeđen plohama  $z = y^2$ ,  $x = 10$ ,  $z = -\frac{x}{3}$  i  $z = 9$ .
3. Odrediti volumen područja koje odgovara nejednadžbama  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$  (kugla) i  $x^2 + y^2 \geq z^2$  (stožac).
4. Zadano je područje  $X$  u koordinatnom sustavu na slici ispod (pravokutnik dimenzija  $10 \times 15$ , a iznad polukrug radijusa 5). Zadana je sila  $f(x, y) = 5 + \frac{y}{5}$ . Izračunati  $\iint_X f(x, y) \, dx \, dy$

~~0~~  
25  
~~0~~  
~~0~~

IME I PREZIME:

MARKO ĆIPIN

BROJ INDEKSA:

$$3. \quad x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \quad x^2 + y^2 \geq z^2$$

$$r^2 + z^2 \leq 9$$

$$r^2 \geq z^2$$

$$r^2 + r^2 = 9$$


$$r = z^2$$

$$2r^2 = 9$$

$$z = \sqrt{r} = 1,456$$

$$r = \sqrt{\frac{9}{2}} = 2,121$$

~~X~~



$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{2,121} \int_{\sqrt{r}}^{\sqrt{9-r^2}} r \, dz \, dr \, dy$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{2,121} r(9 - r^2 - r^2) \, dr \, dy$$



$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{2,121} (9 - 2r^2) \, dr \, dy$$


$$V = \int_0^{2\pi} \left( 9r - \frac{2r^3}{3} \right) \Big|_0^{2,121} \, dy$$

$$V = \int_0^{2\pi} (19,089 - 6,36) \, dy = \int_0^{2\pi} 12,729 \, dy = 12,729y \Big|_0^{2\pi}$$

$$V = 79,938$$

2.  
 $z = y^2$   
 $x = 10$   
 $z = -\frac{x}{3}$   
 $z = 9$

$$\begin{array}{c|c|c} z & 0 & -1 \\ \hline x & 0 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|c|c|c} z & 0 & 1 & 4 & 1 & 4 \\ \hline y & 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \end{array}$$



$$y = y^2$$

$$y = 3$$

$$y = -3$$

$$y = -\frac{x}{3}$$

$$y \in [-3, 3] \checkmark$$

$$x \in [10, -3z] \checkmark$$

$$z \in [9, y^2] \checkmark$$

$$V = \int_{-3}^3 \int_{-\frac{x}{3}}^9 \int_{-3z}^{10} dx dz dy$$

$$V = \int_{-3}^3 \int_{y^2}^9 (10 + 3z) dz dy = \int_{-3}^3 \left( 10z + \frac{3z^2}{2} \right) \Big|_{y^2}^9 dy$$

$$= \int_{-3}^3 \left[ \left( 10 \cdot 9 + \frac{3 \cdot 81}{2} \right) - \left( 10y^2 + \frac{3 \cdot y^4}{2} \right) \right] dy$$

$$\int_{-3}^3 \left[ 211,5 - 10y^2 - \frac{3y^4}{2} \right] dy$$

$$\left( 211,5y - \frac{10y^3}{3} - \frac{3y^5}{10} \right) \Big|_{-3}^3$$

$$\left( 211,5 \cdot 3 - \frac{10 \cdot 27}{3} - \frac{3 \cdot 243}{10} \right) - \left( 211,5 \cdot (-3) - \frac{10 \cdot (-3)^3}{3} - \frac{3 \cdot (-3)^5}{10} \right)$$

$$= 471,6 + 471,6 = 943,2$$

25

IME I PREZIME:

MARLO ŽIPIN

BROJ INDEKSA:

$$1. \iint_{K(1,2)} x \, dx \, dy = \iint_0^{2\pi} \int_0^2 r \cos \varphi \, dr \, d\varphi$$

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$$


$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 (r \cos \varphi + 2) \, dr \, d\varphi$$

nedostaje  $r$  zbog  
prijelaza u  
polarne koordinate.

$$\int_0^{2\pi} \cos \varphi \left( \frac{r^2}{2} + 2r \right) \Big|_0^2 \, d\varphi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos \varphi (2 + 4) \, d\varphi = \int_0^{2\pi} 6 \cos \varphi \, d\varphi$$

$$= 6 \int_0^{2\pi} \cos \varphi \, d\varphi = 6 \sin \varphi \Big|_0^{2\pi} = 6 \cdot \sin 2\pi = 6 \cdot 0 = 0$$



$$4. \iint_x f(x,y) \, dx \, dy = \int_{-5}^5 \left( 5y + \frac{y^2}{10} \right) \Big|_0^{85} \, dy$$

$$= \int_{-5}^5 \left( 97.5 + \frac{22.15}{10} \right) \, dy = (97.15x) \Big|_{-5}^5 \, dy$$

$$= \int_{-5}^5 127.15 \, dy$$

$(-5, 15)$   
 $(5, 15)$   
 $y - 15 = \frac{15 - 15}{5 + 5} (x + 5)$   
 $y = 15$

VIDI DUNATOV, BARIČEVIĆ